

Wirkung auf weibliche Alopezie (FPHL : Female Pattern Hair Loss) durch Rayocomp PS 10

Die weibliche androgenetische Alopezie (Female Androgenetic Alopecia) ist genetisch bedingter Haarausfall bei Frauen, bei dem Hormone wie Testosteron und Dihydrotestosteron eine Rolle spielen. Dies führt zu einer Verkürzung der Haarwachstumsphase, feinerem Haar und allmählicher Ausdünnung, insbesondere im Scheitelbereich. Es tritt typischerweise nach der Menopause auf, kann aber auch jüngere Frauen betreffen. Symptome sind eine schrittweise Haarverdünnung im Scheitel, wobei der Haaransatz intakt bleibt. Ursachen sind genetische Veranlagung, Hormonspiegel, Alter und Umweltfaktoren.

Wie die Bioresonanz nach Paul Schmidt bei dieser Erkrankung unterstützend eingesetzt werden kann, hat eine einfach blind randomisierte kontrollierte Studie in Japan gezeigt.

Probanden: Frauen im Alter von 40 – 59 Jahren, die an FPHL (inkl. FAGA und Alopezie areata) leiden.

Testgruppe: 15 Person


Vergleichsgruppe: 12 Person

Zeitdauer : vom März bis Juni 2023, 12 Wochen



Anwendung: Jeder Proband der Testgruppe erhielt einen Rayocomp PS10 und verwendete es jeden zweiten Tag, 75 Minuten im Bett zu Hause.

Bewertung: Durchmesser der Haare (mm), Zustand des Kopfs (score), Anzahl der gesamten Haare (Stück / 0,594 cm²), Haardichte (1 / cm²), Haare im Wachstum (%)

Subjektive Bewertung: Haarverlust beim Waschen, Normaler Haarverlust, Festigkeit der Haare, Haptik, Frisierbarkeit, Fett auf der Kopfhaut, Juckreiz an der Kopfhaut



Frau 50 Jahre vorher - nachher



Analysenbild mit dem die „Gesamtzahl, die Haardichte und der Prozentsatz der wachsenden Haare“ bewertet wurden.

Zusammenfassung:

Ein klinischer Versuch mit dem Bioresonanzgerät Rayocomp PS 10 wurde 12 Wochen lang ohne Unterbrechung an Frauen über 40 mit der weiblichen Alopezie durchgeführt. Das Ergebnis zur Vergleichsgruppe (es gibt keinen signifikanten Unterschied zur Test-Gruppe im Alter, Rauchgewohnheit, Berufstätigkeit noch im täglichen Lebensstil) zeigte nach 12 Wochen im Durchmesser der Haare und im Kopfzustand signifikante Besserungen. Auch die subjektive Beurteilung der Probanden selbst war in fünf Punkten nach acht Wochen, zwei Punkten nach 12 Wochen im Vergleich zu der Vergleichsgruppe signifikant besser. Im Vergleich zu dem Zustand vor dem Versuch war sie in einem Punkt nach vier Wochen, in vier Punkten nach acht Wochen und sechs Punkten nach 12 Wochen signifikant besser. Dies weist darauf hin, dass die Anwendung von Rayocomp PS 10 über den Zeitraum von 12 Wochen die Haare und den Zustand des Kopfs verbessert.

Abhandlung in der Fachzeitschrift „Advanced Medicine for Health and Beauty“ 2023 No.4 Vol.10 ISSN : 2189-5546 page19

Japan Registry of Clinical Trials in Englisch: <https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs032220646>

Datum der Veröffentlichung: 11.12.2023

Die ausführliche Fassung der Studie kann unter info@rayonex.de angefordert werden.

Rayonex Biomedical GmbH

Sauerland-Pyramiden 1 | 57368 Lennestadt | Telefon +49 2721 6006-0 | info@rayonex.de | www.rayonex.de

© Art.-Nr.: 6780 | Stand: 23. Januar 2024